



JADWAL IMUNISASI 2010

REKOMENDASI IKATAN DOKTER ANAK INDONESIA (IDAI)



Jenis vaksin	Umur pemberian																						
	Bulan														Tahun								
	Lahir	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	15	18	24	3	5	6	7	8	9	10	12	18
BCG	1x																						
Hepatitis B	1	2					3																
Polio	0		1		2		3						4			5							
DTP			1		2		3						4			5						6(Td)	7(Td)
Campak									1							2							
HIB			1		2		3					4											
Pneumokokus (PCV)			1		2		3					4											
Influenza																							
Varisela																							1x
MMR												1					2						
Tifoid																							ulangan tiap 3 tahun
Hepatitis A																							2x, interval 6 – 12 bulan
HPV																							3x

Keterangan

Vaksin	Keterangan
BCG	Optimal diberikan pada umur 2 sampai 3 bulan. Bila vaksin BCG akan diberikan sesudah umur 3 bulan, perlu dilakukan uji tuberkulin. Bila uji tuberkulin pra-BCG tidak dimungkinkan, BCG dapat diberikan, namun harus diobservasi dalam 7 hari. Bila ada reaksi lokal cepat di tempat suntikan (<i>accelerated local reaction</i>), perlu dievaluasi lebih lanjut (diagnostik TB).
Hepatitis B	Pertama diberikan dalam waktu 12 jam setelah lahir.
Polio	Diberikan saat kunjungan pertama. Bayi yang lahir di RB/RS diberikan vaksin OPV saat bayi dipulangkan untuk menghindari transmisi virus vaksin kepada bayi lain. Selanjutnya dapat diberikan vaksin OPV atau IPV.
DTP	Diberikan pada umur > 6 minggu. Dapat diberikan vaksin DTwP atau DTaP atau kombinasi dengan Hepatitis B atau Hib. Ulangan DTP umur 18 bulan dan 5 tahun. Program BIAS: disesuaikan dengan jadwal imunisasi Kementerian Kesehatan.
Campak	Diberikan pada umur 9 bulan, vaksin ulangan diberikan pada umur 5 – 7 tahun. Program BIAS : disesuaikan dengan jadwal imunisasi Kementerian Kesehatan.

Vaksin	Keterangan
Pneumokokus (PCV)	Dapat diberikan pada umur 2,4,6, 12-15 bulan. Pada umur 7 – 12 bulan, diberikan 2 kali dengan interval 2 bulan; pada umur > 1 tahun diberikan 1 kali, namun keduanya perlu dosis ulangan 1 kali pada umur 15 bulan atau minimal 2 bulan setelah dosis terakhir. Pada anak umur di atas 2 tahun PCV diberikan cukup satu kali.
Varisela	Dapat diberikan setelah umur 12 bulan, terbaik pada umur sebelum masuk sekolah dasar. Bila diberikan pada umur > 12 tahun, perlu 2 dosis dengan interval minimal 4 minggu.
MMR	Dapat diberikan pada umur 12 bulan, apabila belum mendapat vaksin campak umur 9 bulan. Selanjutnya MMR ulangan diberikan pada umur 5-7 tahun.
Influenza	Diberikan pada umur ≥ 6 bulan, setiap tahun. Pada umur < 9 tahun yang mendapat vaksin influenza pertama kalinya harus mendapat 2 dosis dengan interval minimal 4 minggu.
HPV	Jadwal vaksin HPV bivalen 0, 1, 6 bulan; vaksin tetravalen 0, 2, 6 bulan. Dapat diberikan mulai umur 10 tahun.